

ФУНГИЦИД

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: тебуконазол 750 г/кг

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ:
25-04-15-02-1893 от 15.04.2025

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА:

водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

ТОКСИЧНОСТЬ:

класс опасности – III/III

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Препарат впитывается надземными частями растения и распределяется акропетальном во внутренние ткани, где блокирует распространение гриба путем подавления процесса синтеза эргостерола, что приводит к невозможности гриба формировать клеточную стенку.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Системный фунгицид защитного, лечебного и эрадикационного действия.
- После попадания в растение, переносится по ксилеме к зеленым органам растения, включая отростки, появившиеся после обработки.
- Может наноситься на всех фазах развития растения, в экстремальных условиях, даже во время цветения, не нанося вреда опылению и качеству фруктов.
- Устойчив к атмосферным осадкам.
- Выраженный «стоп-эффект».
- Широкий спектр воздействия и высокая биологическая эффективность.
- Безопасен для пчел.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Препарат может быть использован в сочетании с большинством фунгици-



дов, инсектицидов, листовых подкормок, за исключением оказывающих щелочное и окислительное действие. В целях безопасности тестируйте препараты на совместимость перед применением.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

- Не превышайте рекомендованные дозы.
- Использовать необходимый объем жидкости, для того чтобы обеспечить равномерное покрытие всех органов растений (особенно нижняя часть листа и грозди).
- Производится профилактическая обработка или при появлении первых признаков заражения, интервал между обработками 7-10 дней.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Культура	Вредный объект	Норма расхода препарата, кг/га	Срок ожидания перед сбором урожая (Максимальное количество обработок)	Срок выхода в поле для выполнения ручных работ (механизированных)
Яблоня	Мучнистая роса		35 (2-3)	
Виноград	Оидиум			
Слива	Клястероспориоз Красная пятнистость сливы Монилиоз	0,25 - 0,3	14 (1-3)	7 (3)
Черешня, вишня	Клястероспориоз Кокомикоз Монилиоз		20 (2-3)	
Персик	Клястероспориоз Мучнистая роса		7 (2-3)	
Абрикос	Клястероспориоз		7 (1-3)	
Пшеница	Гельминтоспориоз Мучнистая роса		35 (1)	
Рапс	Белая гниль Фомоз Альтернариоз	0,3 - 0,4	56 (1-2)	- (3)

Норма расхода рабочей жидкости: сады: 800-1500 л/га;
 виноград: 600-800 л/га;
 пшеница, рапс: 200-400 л/га.

