

ФУНГИЦИД

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: протиоконазол 175 г/л
+ трифлокистробин 150 г/л

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ:
№: 24-03-28-02-1582 от 28.03.2024

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА:
концентрат супсепзии (КС)

ТОКСИЧНОСТЬ:
класс опасности – IV/III

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Neo Супер КС – системный фунгицид на основе двух активных веществ с взаимодополняющим действием.

Трифлокистробин из класса стробилуринов нарушает процесс дыхания в митохондриях клеток возбудителя.

Протиоконазол из класса триазолов, тормозит развитие гифов и грибницы путем нарушения процесса биосинтеза стеролов в клеточной мембране.

Наличие двух действующих веществ вместе с различным механизмом действия предотвращает возникновение устойчивости возбудителей болезней к препарату.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Препарат обладает системным и трансламинарным действием, проникая через листовую пластинку, и защищает ее с обеих сторон от атак патогенов.
- Увеличение урожайности за счет усиления фотосинтеза и продления работы листового аппарата.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Контроль наиболее экономически значимых заболеваний зерновых культур.

- Эффективное решение в борьбе с фузариозом колоса пшеницы.
- Обладает искореняющим, защитным и лечебным действием.
- Защищает молодые ткани за счет системности протиоконазола.
- Быстрое проникновение в растение, лучшая устойчивость к смыванию дождем.
- Высокая устойчивость к стресс-факторам.
- Высочайшая адаптивность к погодным условиям.
- Средство активно против развития патогенов на всех их фазах.
- В рекомендуемых для применения нормах не оказывает отрицательного действия на культурные растения.





РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Культура	Вредный объект	Норма расхода препарата, л/га	Срок ожидания перед сбором урожая (Максимальное количество обработок)	Срок выхода в поле для выполнения ручных работ (механизированных)
Пшеница	Бурая ржавчина Септориоз пшеницы Желтая пятнистость листьев пшеницы	0,6 - 0,7	35 (2)	- (3)

Норма расхода рабочей жидкости: 200-400 л/га.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Фунгицид Нео Супер КС совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов. Однако в каждом случае необходимо предварительно проверить на совместимость.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

- Не превышайте рекомендованные дозы.
- Обработки проводятся в безветренные дни и в прохладные часы дня.
- Обработки с Нео Супер КС проводятся профилактически или лечебно, при появлении первых симптомов.
- Первую обработку обычно проводят в период между окончанием кущения и окончанием колошения.
- Для эффективного контроля фузариоза колоса необходимо применить Нео Супер КС до момента заражения: когда на главном стебле появилось 75 % колосьев, и заканчивать до фазы, когда 50 % колосьев отцвели (ВВСН 55-65). Более ранние или более поздние обработки неэффективны. Нужно ориентироваться по выходу пыльников в средней части колоса. Как



только увидите первые пыльники - приступайте к обработке, с использованием максимальной нормой - 0,7 л/га.

