

 **Mospelat® 20 SL****INSECTICID****SUBSTANȚA ACTIVĂ:** acetamiprid 200g/l**CERTIFICAT DE OMOLOGARE:**
Nr. 20-06-11-01-0692 din 11.06.2020**FORMA PREPARATIVĂ:**
concentrant solubil (SL)**TOXICITATE:**
clasa de pericolozitate – III/III**MECANISMUL DE ACȚIUNE:**

Mospelat 20 SL este un insecticid sistemic, pe bază de acetamiprid, din grupa produselor neonicotinoide. Acetamiprid acționează asupra sistemului nervos central, interferând în transmiterea impulsurilor nervoase.

AVANTAJE:

- Este un insecticid sistemic, unic cu o excelență activitate translaminară.
- Formularea lichidă, foarte performantă și ușor de utilizat.
- Controlează un spectru larg de dăunători - rozători și sugători.
- Substanța activă a produsului are un efect knock-down.
- Prezintă o acțiune rapidă, provocând în scurt timp după administrare, paraliza și moartea insectei.
- Insectele sunt controlate de pe ambele fețe ale frunzei.
- Nu este afectat de temperatură, stabil în contactul cu razele solare.
- După aplicare, pătrunde translaminar în plante și nu este spălat de ploi sau apa de irigare.

- Non-fitotoxic pentru plantele cultivate.

COMPATIBILITATEA:

- Este compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar sau fertilizanți, făcând excepție cele cu reacție alcalină (ex. Zeama Bordelează) și uleiuri minerale. Pentru o folosire corectă trebuie verificat compatibilitatea produselor care se vor amesteca.

TEHNICA DE APLICARE:

- Trebuie aplicat la dozele recomandate, în perioada de eclozare a primelor larve;
- Nu pulverizați în condiții de vânt;
- Nu aplicați înainte de 2-4 ore de ploaie;
- Produsul se aplică prin stropire cu echipamente terestre cu volumul necesar de soluție, astfel încât să se asigure o acoperire uniformă a întregului foliaj, dar nu mai mult de punctul de scurgere al soluției.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Viermele merelor; Molii tortricide; Păduchele verde al mărlului	0,3 - 0,45	28 (2-3)	7 (3)
Prun	Viespi; Viespea semințelor de prun; Păduchele cenușiu al prunului; Viermele prunelor		28 (2)	
Vița de vie	Cicorițe; Molia verde a strugurilor	0,2 - 0,3	7 (2)	
Cais	Molia orientală a fructelor; Păduchele verde al piersicului	0,25 - 0,3	14 (2)	7 (3)
Piersic	Molia orientală a fructelor; Păduchele verde al piersicului	0,3 - 0,4		
Cireș	Musca cireșelor; Păduchele negru al cireșului	0,25		
Vișin	Musca cireșelor			
Grâu	Tripsul grâului; Păduchele verde al cerealelor; Gândacul ovăzului; Ploșnițe	0,25	45 (1)	- (3)
Rapiță	Gândacul lucios al rapiței; Gărgărița tulpinilor de varză; Păduchele cenușiu al verzei; Țânțărașul rapiței		28 (2)	
Cartof	Gândacul din Colorado		7 (2-3)	7 (3)
Tomate	Afide; Buha fructificațiilor	0,15 - 0,2	7 (2)	7 (3)
Varză	Molia verzei; Păduchele cenușiu al verzei; Buha verzei; Albițe; Purici			

Norma de consum a soluției de lucru: livezi: 1000-1500 l/ha;
 vița de vie: 800-1000 l/ha;
 legume și culturi de câmp: 300-400 l/ha.

