

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ:
№ 22-12-22-02-1190 от 22.12.2022

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Фолипек 80 ВДГ контактный фунгицид защитного действия с частично лечащим эффектом, широкого спектра действия на основе фолпета. Фолпет это производное класса фталимида и трихлорметил сульфонилхлорид. Фолпет, проникая в прорастающую конидию или спору, ингибирует клеточное деление, подавляет процесс дыхания патогена, нарушает проницаемость клеточных мембран.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая биологическая эффективность в борьбе с основными болезнями.
- Оказывает как профилактическое, так и частично лечебное действие.

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА:

водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)


ТОКСИЧНОСТЬ:

класс опасности – IV/IV

- Полное отсутствие резистентности патогенных организмов.
- Не фитотоксичен, безопасен для пчел, полезной энтомофауны, микроорганизмов и птиц.
- Замечательная фитосовместимость на разных стадиях развития растения.
- Повышенная адгезия, определяющая стабилизацию в неблагоприятных погодных условиях.
- Длительное защитное действие.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Препарат совместим в баковых смесях с большинством фунгицидов и инсектицидов, за исключением веществ, образующих щелочные растворы (например бордоская жидкость или сера). Не смешивать с маслами.





РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

| Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, кг/га | Срок ожидания перед сбором урожая (Максимальное количество обработок) | Срок выхода в поле для выполнения ручных работ (механизированных) |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---|---|
| Яблоня | Парша | 1,5 - 2,0 | 21 (2-3) | 7 (3) |
| Слива ■ | Красная пятнистость | | В процессе расширения регистрации | |
| Черешня ■ | Клястероспориоз Коккомикоз | | | |

Норма расхода рабочей жидкости: 1000-1500 л/га.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **Не превышайте рекомендованные дозы.**
- Обеспечить равномерное покрытие растений.
- Не применять в ветреную погоду или за 4-6 часов до начала дождя.
- Применяется в течение всего вегетационного периода, в зависимости от инфекционного давления и климатических условий, с интервалом 7-10 дней.
- Используется в комбинации с системными фунгицидами, что позволяет контролировать весь спектр заболеваний, а также предотвращать развитие устойчивости популяций возбудителей к системным препаратам.

■ Препарат в процессе расширения регистрации