

Polimorf® 70 DF



FUNGICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: metiram 700 g/kg

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 22-12-22-02-1193 din 22.12.2022

FORMA PREPARATIVĂ:

granule uniform dimensionate (DF)

TOXICITATE:

clasa de pericolozitate – IV/III

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Polimorf 70 DF este un fungicid pe bază de metiram, din grupa ditiocarbamaților, cu spectru larg de combatere a bolilor. Acționează prin contact, împiedică germinarea sporilor ciupercilor, având însă efect și asupra dezvoltării ulterioare a tuburilor germinative. Acțiunea sa inițială este foarte rapidă. Se recomandă aplicarea preventivă, într-un program de combatere specific pentru fiecare cultură, înainte instalării atacului agentului patogen.

AVANTAJE:

- Produs cu substanță activă unică și formulare de înaltă calitate (DF).
- Formularea în microgranule dispersabile în apă garantează absența prafului, solubilitatea perfectă și miscibilitatea în rezervor.
- Excelentă formulare a produsului, care determină o mai mare eficacitate în combaterea bolilor.
- Poate fi aplicat în toate fazele de dezvoltare a culturii.



- Acțiune rapidă și efect multi-site.
- Buna aderență la suprafața frunzelor.
- Spectru larg de combatere a bolilor.
- Risc foarte scăzut de apariție a rezistenței.
- Toxicitate redusă pentru albiși, practic inofensiv pentru entomofauna utilă.

COMPATIBILITATEA:

Este în general miscibil cu insecticide și fungicide, precum și cu îngrășăminte foliare. Cu excepția produselor cu reacție puternică acidă și puternic alcalină (preparate pe bază de sulf și zeamă bordelează). Pentru orice combinații se va face în prealabil un test de com-

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Rapănul mărului (<i>Venturia inaequalis</i>)	2,0 - 2,5	30 (2-3)	7 (3)
Prun	Clasterosporioza (<i>Clasterosporium carpophilum</i>) Pătarea roșie a frunzelor (<i>Polystigma rubrum</i>) Rujina frunzelor (<i>Tranzschelia pruni spinosae</i>)		28 (2)	

Norma de consum a soluției de lucru: 1000-1500 l/ha.

patibilitate fizico-chimică. Dacă sunt depuneri de sediment, aceste substanțe nu pot fi amestecate.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Asigurați o acoperire uniformă a întregului foliaj al pomilor.
- Este utilizat în combinație cu fungicide sistemice pentru a controla întregul spectru de boli.
- Funcționează excelent în lupta împotriva rapănului mărului de la începutul sezonului de vegetație, protejând în siguranță plantele până la coacerea fructelor.
- Pentru a preveni dezvoltarea infecției primare, prima tratare se efectuează din faza de con verde.



- Fungicidul se aplică la temperaturi peste +5° C pentru a obține eficacitatea maximă.
- Nu pulverizați în condiții de vânt sau înainte de 4-6 ore de ploaie.



FUNGICIDE

