

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 20-06-11-01-0695 din 11.06.2020

FORMA PREPARATIVĂ:

suspensie concentrată (SC)

TOXICITATE:

clasa de periculozitate – III/I

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Zenin 25 SC este un insecticid pi-retroid, cu o puternică acțiune de contact și ingestie asupra adulților și larvelor unei game largi de dăunători. După aplicare, substanța activă penetrează rapid cuticula insectei acționând asupra sistemului nervos, dăunătorul încetează să se hrănească, după care paralizează și mor repede.

AVANTAJE:

- Acțiune pronunțată prin contact și ingestie asupra dăunătorilor.
- Acționează rapid, total și ireversibil.
- Nu este fitotoxic în dozele recomandate la culturile omologate.
- Se utilizează în doze mici.
- Avantajos din punct de vedere economic.
- Compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar omologate la cultura dată.
- Insecticid non-sistemic cu efect rezidual bun pe suprafața tratată.

- Preparatul posedă rezistență maximă la acțiunea razelor UV și precipitațiilor cu condiția ca soluția să fie uscată înainte de a începe să plouă.

INDICAȚII DE UTILIZARE:

Se va evita aplicarea la temperaturile ridicate din timpul zilei, când dăunătorii sunt puțin expuși și fotodegradarea este intensă.



ATENȚIE! Se impune respectarea măsurilor de protecție față de albine și zoofagi. Pentru a proteja albinele și alte insecte polenizatoare nu aplicați pe plante în timpul înfloriturii. Nu utilizați produsul în timpul sezonului activ al albinelor.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Viespea cu fereastră Molii tortricide Viermele merelor	0,2 - 0,25	20 (1-2)	10 (4)
Prun	Viespea semințelor de prun Viespi Viermele prunelor	0,2		7 (3)
Cais	Molia orientală Molia vărgată a fructelor	0,12 - 0,15	7 (1-2)	7 (4)
Rapiță	Gândacul lucios al rapiței Gărgărița tulpinilor de varză Păduchele cenușiu al verzei	0,08 - 0,1	30 (1-2)	- (3)
Grâu	Tripsul grâului Gândacul ovăzului Păduchele verde al cerealelor Ploșnițe	0,1	30 (1)	

Norma de consum a soluției de lucru: măr, prun, cais: 1000-1500 l/ha;
rapiță, grâu: 200-400 l/ha.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt.
- Tratamentul nu se va efectua în condiții de stres termic.
- De folosit un volum necesar de soluție, astfel încât să se asigure o acoperire uniformă a întregului foliaj, dar nu mai mult de punctul de scurgere al soluției de lucru.



INSECTICIDE

