



Tepechi 50 WG



INSECTICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: flonicamid 500 g/kg

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 25-11-21-01-2015 din 21.11.2025

FORMA PREPARATIVĂ:

granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE:

clasa de periculozitate – IV/III

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Tepechi 50 WG este un aficid specific, utilizat pentru combaterea afidelor și musculiței albe din culturile legumicole și horticole. Are acțiune sistemică și translaminară, pătrunde în plante prin frunze, lăstari și circulă acropetal. Poate fi absorbit și din sol de către sistemul radicular și translocat în organele superioare ale plantei. Asupra insectelor dăunătoare acționează prin contact și ingestie, determinând inhibarea hrănirii și moartea prin inanție (foame). **Tepechi 50 WG** acționează atât asupra afidelor imature cât și a celor adulte, iar eficacitatea sa nu este influențată de temperaturile din momentul aplicării și de intensitatea luminoasă.

PROPRIETĂȚI:

- Flonicamid-ul este un inhibitor de hrănire (stoparea proceselor de hrănire).
- Are o acțiune mai bună prin ingestie decât prin contact.
- Afidele trebuie să se hrănească cu părțile plantelor tratate cu Tepechi 50 WG pentru a absorbi ingredientul activ. Hrănirea înce-

tează în decurs de 1 oră, iar mortalitatea apare în decurs de 2-5 zile.

AVANTAJE:

- Tepechi 50 WG este un aficid specific care controlează toate speciile de afide.
- Are mișcare translaminară și sistemică în interiorul plantei pentru a ajunge la noi creșteri și la partea inferioară a frunzelor.
- Economic: un singur tratament garantează protecție de lungă durată (până la 28 de zile).
- Insecticidul Tepechi 50 WG este rezistent la ploaie, după 3 ore de la aplicare.
- Eficacitatea nu este redusă de temperaturi ridicate sau de intensitatea mare a luminii.
- Risc redus pentru insectele benefice, ideal pentru gestionarea integrată a dăunătorilor (IPM).
- Compatibilitate excelentă cu majoritatea pesticidelor.

COMPATIBILITATEA:

Nu se recomandă utilizarea amestecurilor în rezervor cu preparate pu-

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Păducele verde al mărului Păducele roz galic al mărului Păducele lănos al mărului	0,1 - 0,14	21 (2-3)	7 (3)
Cireș	Păducele negru al cireșului		14 (2)	
Piersic	Afide	0,12 - 0,14	14 (2)	
Varză	Păducele cenușiu al verzei Musculița albă a verzei Tripsul tutunului		21 (2)	
Ardei	Musculița albă de seră Tripsul tutunului Păducele verde al piersicului		7 (2)	
Mazăre	Păducele verde al mazării	0,14	14 (1)	

Norma de consum a soluției de lucru: măr, cireș, prun: 1000-1500 l/ha;
ardei, varză, mazăre: 200-400 l/ha.

ternic alcaline, precum și cu compuși de cupru și calciu. Înainte de utilizarea oricărui amestec este recomandat să se facă un test de compatibilitate fizico-chimică și efectuați un test pe cultura respectivă.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt.

- Se vor aplica tratamente la avertizare, la apariția adulților și a larvelor sau la depășirea pragului economic de dăunare în funcție de dăunător.
- Produsul se aplică prin stropire cu echipamente terestre cu volumul necesar de soluție, astfel încât să se asigure o acoperire uniformă a întregului foliaj, dar nu mai mult de punctul de scurgere al soluției.



INSECTICIDE

