

Boscad 50 WG



ФУНГИЦИД

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: боскалид 500 г/кг

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ:
№: 25-11-21-02-2019 от 21.11.2025

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА:
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

ТОКСИЧНОСТЬ:
класс опасности – IV/IV



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Боскад 50 ВДГ системный фунгицид на основе боскалида из группы карбоксамидов, применяемый для борьбы с серой гнилью винограда и монилиозом абрикоса, черешня и сливы. Действующее вещество боскалид, воздействует на комплекс II цикла Кребса возбудителя, что приводит к прекращению выработки энергии в клетках. Боскад 50 ВДГ подавляет прорастание спор и образование ростковых трубок, а также появление апгрессориев и пенетрационных элементов. Эти эффекты в частности

приводят к блокировке метаболизма патогена. Продукт оказывает многофакторное действие, сводя к минимуму возможность возникновения резистентности.

СВОЙСТВА:

Боскалид, действующее вещество препарата Боскад 50 ВДГ, обладает средней растворимостью в воде и жирорастворимостью. Это важные условия, которые делают боскалид системным веществом, обеспечивающим его проникновение и мобильность в растении.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Культура	Вредный объект	Норма расхода препарата, л/га	Срок ожидания перед сбором урожая [Максимальное количество обработок]	Срок выхода в поле для выполнения ручных работ (механизированных)
Абрикос, черешня	Монилиоз	0,4 - 0,5	7 (2-3)	7 (3)
Слива			7 (2)	
Виноград	Серая гниль	1,0 - 1,2	21 (1)	

Норма расхода рабочего раствора: 1000-1500 л/га.

После применения часть вещества остается на поверхности растения и защищает его от переносимых по воздуху спор грибковых патогенов. Другая часть действующего вещества поглощается растением и хранится трансламинарно, проникая в ткани. Часть поглощенного действующего вещества системно транспортируется через сок к кончику листа или к периферии листа.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Профилактическое и лечебное действие.
- Широкое трансламинарное покрытие листа.
- Длительный период защиты.
- Высокая проницаемость.
- Действие препарата распространяется также на резистентные формы грибка.

- Может использоваться в комплексных системах защиты.
- Продукт совместим с большинством средств защиты растений. Перед применением рекомендуется провести тест на совместимость.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

- Не превышайте рекомендованные дозы.**
- Не опрыскивайте в ветреную погоду.
- Используйте необходимый объем раствора, чтобы обеспечить равномерное покрытие всей листья и менее открытых частей стволов виноградной лозы (особенно нижней части и гроздей).
- Рекомендуется использовать продукт в профилактических целях.
- Оптимальное время применения фунгицида Боскад 50 ВДГ против серой гнили – фаза предсозревания.

