



Acarin® WP

Slava
group

TM

АКАРИЦИД

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: тебуфенпирад 200 г/кг

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ:
№ 25-04-15-01-1885 от 15.04.2025

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА:
смачивающийся порошок (СП)

ТОКСИЧНОСТЬ:
класс опасности – III/III

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Акарин СП является акарицидом контактного и кишечного воздействия, подавляющим митохондрическое дыхание клещей. Препарат характеризуется высокой токсичностью в отношении вредителей и с продолжительным сроком защиты культуры.

СВОЙСТВА:

- Воздействует на всех стадиях развития (яйцо - личинки- имаго) хорошо выражено овицидное воздействие (при появлении летней популяции).

- Ограничивает повторную колонизацию клещей.
- Высокая селективность, не воздействует на хищных клещей.
- Безопасен для пчел (может быть применен в период цветения).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обладает трансламинарным свойством, уничтожая клещей и на нижней части листа.
- Эффективен при широком температурном диапазоне.
- Совместим с многими фунгицидами, инсектицидами и фертилизантами.





- Хорошее прилипаемость к растениям, высокая устойчивость к осадкам.
- Не является фототоксичным для растений.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Культура	Вредный объект	Норма расхода препарата, л/га	Срок ожидания перед сбором урожая (Максимальное количество обработок)	Срок выхода в поле для выполнения ручных работ (механизированных)
Яблоня	Клещи	0,4 - 0,5	30 (1-2)	7 (3)
Слива			21 (1-2)	
Виноград	Обыкновенный паутинный клещ		14 (1)	

Норма расхода рабочей жидкости: яблоня, слива: 800-1500 л/га;
виноград: 600-800 л/га.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **Не превышайте рекомендованные дозы.**
- Не работать в ветреную погоду.
- Используется объем жидкости, достаточный для обеспечения хорошего покрытия всей листвы.
- Опрыскивать весной, при появлении 70-80% зимующих особей.
- Летом при появлении летней популяции.

