



Acarin® WP



ACARICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: tebufenpirad 200 g/kg

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 25-04-15-01-1885 din 15.04.2025

FORMA PREPARATIVĂ:

pulbere umectabilă (WP)

TOXICITATE:

clasa de pericolozitate – III/III

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Acarin WP este un acaricid cu acțiune de contact și ingestie, care inhibă respirația mitocondrială a acarienilor. Preparatul se caracterizează prin toxicitate înaltă față de dăunători și termen de protecție sporit a culturii.

PROPRIETĂȚI:

- Acționează asupra tuturor stadiilor de dezvoltare (ouă-larve-adulți) puternic pronunțată acțiunea ovicidă (la apariția populației de vară).

- Limitează recolonizarea acarienilor.
- Selectivitate înaltă, nu acționează asupra masculilor și acarienilor răpitori.
- Inofensiv pentru albine (poate fi aplicat în perioada înfloririi).

AVANTAJE:

- Prezintă proprietăți translaminare, sublimând astfel acarienii și pe partea inferioară a frunzei.
- Este eficient într-un diapazon mare de temperaturi.





- Compatibil cu multe fungicide, insecticide și fertilizanți foliari.
- Aderență bună pe plante, rezistență mare la precipitații.
- Nu este fitotoxic pentru plante.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Acarieni	0,4 - 0,5	30 (1-2)	7 (3)
Prun			21 (1-2)	
Vița de vie	Acarianul roșu comun		14 (1)	

Norma de consum a soluției de lucru: măr, prun: 800-1500 l/ha;
vița de vie: 600-800 l/ha.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt.
- Folosiți un volum de soluție suficient pentru a asigura o bună acoperire a foliajului.
- Se aplică primăvara la ieșirea a 70-80% a larvelor.
- Vara – la apariția populației de vară.

