



# Norus® 75 WG

Slatava  
grup  
TM

ФУНГИЦИД

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: ципродинил 750 г/кг

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ:  
№ 20-12-17-02-0849 от 17.12.2020

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА:  
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

ТОКСИЧНОСТЬ:  
класс опасности – IV/IV

#### МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

**Норус 75 ВДГ** - системный фунгицид с профилактическим и лечебным действием против широкого спектра фитопатогенов. Действующее вещество ципродинил быстро проникает в мицелий восприимчивых грибов и предотвращает возникновение инфекций на обработанных органах, блокируя их дыхание и деление клеток.

#### СВОЙСТВА:

- Уникальный механизм действия.
- Системное, защитное и лечебное действие.
- Низкий риск резистентности.
- Может применяться во время цветения плодовых культур.

- Усиливает приток питательных веществ к точке роста.
- Способствует развитию мощной листовой поверхности и улучшению фотосинтеза.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокоэффективная защита листьев при любой инфекционной нагрузке даже при низких температурах воздуха (от +5° С).
- Единственное действующее вещество из данного класса: антирезистентное решение.
- Быстрое поглощение растением: не смывается дождем.
- Отсутствие фитотоксичности.
- Удобная препаративная форма и упаковка.



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Культура	Вредный объект	Норма расхода препарата, кг/га	Срок ожидания перед сбором урожая (Максимальное количество обработок)	Срок выхода в поле для выполнения ручных работ (механизированных)
Яблоня	Парша яблони Монилиоз	0,3 - 0,4	28 (2-3)	
Слива	Красная пятнистость сливы			
Черешня	Монилиоз Клястероспориоз Кокомикоз	0,35 - 0,4	28 (2)	7 (3)
Персик	Курчавость листьев персика Клястероспориоз Монилиоз	0,35	14 (2)	
Абрикос	Клястероспориоз Монилиоз			

Норма расхода рабочей жидкости: 1000-1500 л/га.

- Совместимость с другими фитосанитарными продуктами.
- Незаменим во всех современных системах защиты плодовых насаждений.
- Применим в баковых смесях с контактными фунгицидами как: Каптон 80 ВДГ в соотношении 1:1, оказывает хороший эффект на длительный период.



## МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

- Не превышайте рекомендованные дозы.**
- Не опрыскивать в ветреную погоду или за 2-4 часа до начала дождя.
- Используйте необходимый объем жидкости, для того чтобы обеспечить однородное покрытие препаратом всей листья.
- Избегайте точки утечки раствора.
- Убедитесь в работе смесителя в течение всего периода обработки.

