



Forsaj® 62,5 WG



FUNGICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: ciprodinil 375 g/kg
+ fludioxonil 250 g/kg

FORMA PREPARATIVĂ:
granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE:
clasa de pericolozitate – IV/IV

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 22-05-19-02-1093 din 19.05.2022

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Ciprodinilul blochează dezvoltarea miceliului și penetrarea lui în țesuturi. Are capacități sistemice și translaminare. **Fludioxonilul** are acțiune de contact și previne germinarea sporilor de infecție pe suprafața organelor tratate.


PROPRIETĂȚI:

- Risc scăzut de apariție a rezistenței.
- Combate rapănul mărului în fazele critice.
- Fungicidul are o acțiune dublă sistemică și de contact, recomandat preventiv și curativ.

- Rezistent la spălare.
- Eficacitatea preparatului nu depinde de temperatura aerului.

AVANTAJE:

- Este rapid absorbit de organele tratate.
- Activitatea produsului nu depinde de temperatura aerului.
- Micșorează efectiv infecția bolilor de depozit, măbind perioada de păstrare a producției.
- Nu face plasă pe fructe.
- Compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar.



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Rapăn	0,35 - 0,4	15 (2-3)	7 (3)
Vița de vie ■ (soiuri de masă)	Putregaiul cenușiu		În proces de extindere	

Norma de consum a soluției de lucru: măr: 800-1000 l/ha;
vița de vie: 600-800 l/ha.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt sau înainte de 2-4 ore de ploaie.
- Aplicați un volum necesar de soluție, astfel încât să asigurați o acoperire uniformă a întregului foliaj.
- Evitați punctul de scurgere al soluției.
- Asigurați funcționarea agitatului pe toată durata tratamentului.



■ Produs în proces de extindere



FUNGICIDE

