

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 22-12-22-02-1190 din 22.12.2022

FORMA PREPARATIVĂ:

granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE:

clasa de pericolozitate – IV/IV

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Folipec 80 WG are la bază folpet, un fungicid preventiv aparținând clasei ftalimidelor. Substanța activă folpet are acțiune preventivă de contact, împiedicând instalarea infecțiilor la suprafața organelor tratate prin blocarea respirației și diviziunii celulare ciupercilor sensibile. Inhibă multe dintre enzimele și carboxilazele cu acțiune oxidantă și de sinteză a citratului.

AVANTAJE:

- Având acțiune multi-site, prin aplicarea produsului se previne apariția rezistenței patogenilor la aplicarea fungicidelor.
- Partener de neînlocuit pentru fungicidele sistemice.
- Aderența sporită determină stabilitatea în condiții meteo nefavorabile ale timpului.
- Este un component important în sistemele integrate de protecție a plantelor.
- Poate fi utilizat de-a lungul întregii perioade cu risc de atac.

- Formularea în microgranule dispersabile în apă garantează absența prafului, solubilitatea perfectă și miscibilitatea în rezervor.
- Folosit conform recomandărilor, poate fi aplicat fără riscuri de fitotoxicitate, având o selectivitate excelentă.
- Nu este toxic pentru albiși și păsări.

COMPATIBILITATEA:

Este compatibil cu majoritatea fungicidelor și insecticidelor, cu excepția produselor cu reacție pu-





RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Rapăn	1,5 - 2,0	21 (2-3)	7 (3)
Prun ■	Pătarea roșie Clasterosporioza		În proces de extindere	
Cireș ■	Clasterosporioza Cocomicoză			

Norma de consum a soluției de lucru: 1000-1500 l/ha.

ternic alcalină (preparate pe bază de sulf și zeamă bordeleză). Nu este compatibil cu produsele uleioase. Pentru mai multă siguranță, se vor consulta tabelele de compatibilitate și se va face un test practic pe cultură.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Asigurați o acoperire uniformă întregului foliaj al pomilor.
- Se aplică în cursul întregii perioade de vegetație, la avertizare sau preventiv, în funcție de presiunea de infecție la interval de 7-10 zile.
- În fazele critice de infecție (ploi frecvente și nebulozitate), se recomandă combinarea produsului cu un fungicid sistemic (de ex: Norus 75 WG, Scorus 25 EC, Scalos 400 SC ș.a.)
- Nu pulverizați în condiții de vânt sau cu 4-6 ore înainte de ploaie.

■ Produs în proces de extindere



FUNGICIDE

