

FUNGICID**SUBSTANȚA ACTIVĂ:** tebuconazol 750 g/kg**CERTIFICAT DE OMOLOGARE:**
Nr. 25-04-15-02-1893 din 15.04.2025**FORMA PREPARATIVĂ:**

granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE:

clasa de pericolozitate – III/III

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Magnet 75 WG este absorbit de părțile aeriene ale plantei și distribuit acropetal în interiorul țesuturilor, unde blochează extinderea ciupercii prin inhibarea procesului de sinteză a ergosterolilor ceea ce duce la incapacitatea ciupercii de a-și forma perete celular.


AVANTAJE:

- Fungicid sistemic cu acțiune protectivă, curativă și eradicativă.
- Odată pătruns în plantă este translocat prin xilemn în toate organele verzi ale plantei, inclusiv în lăstarii apăruiți după aplicarea tratamentului.
- Poate fi aplicat în toate fazele de dezvoltare a plantei, în condiții extreme se pot face tratamente chiar și în timpul înfloritului fără a afecta polenizarea și calitatea fructelor.
- Stabil la precipitațiile atmosferice.

- „Stop-efect” pronunțat.
- Spectru larg de acțiune și eficacitate biologică înaltă.
- Inofensiv pentru albiți.

COMPATIBILITATEA:

Produsul poate fi utilizat în amestec cu majoritatea fungicidelor, insecticidelor și îngrășămintelor foliare, cu excepția celor cu reacție alcalină, acide și oxidante. Pentru o mai mare siguranță se va consulta lista de compatibilitate și se va face un test.



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Făinarea	0,25 - 0,3	35 (2-3)	7 (3)
Vița de vie	Făinarea			
Prun	Clasterosporioza Pătarea roșie a frunzelor Monilioze		14 (1-3)	
Vișin, cireș	Clasterosporioza Monilioză Cocomicoză		20 (2-3)	
Piersic	Clasterosporioza Făinare		7 (2-3)	
Cais	Clasterosporioza	0,3 - 0,4	7 (1-3)	- (3)
Grâu	Făinare Helmintosporioze		35 (1)	
Rapiță	Putregai alb Fomoza Alternarioza		56 (1-2)	

Norma de consum a soluției de lucru: livezi: 1000-1500 l/ha;
vița de vie: 600-800 l/ha;
grâu, rapiță: 200-400 l/ha.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- De folosit un volum necesar de soluție astfel încât să se asigure o acoperire uniformă a întregului foliaj și a părților mai puțin expuse ale butucilor de vie (mai ales partea inferioară și ciorchinii).
- Tratamentele se aplică preventiv sau la apariția primelor semne de infecție, intervalul între tratamente 7-10 zile.



FUNGICIDE