



**ФУНГИЦИД**

**ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО:** дифеноконазол 250 г/л

**СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ:**  
№ 24-02-15-02-1536 от 15.02.2024

**ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА:**

концентрат эмульсии (КЭ)

**ТОКСИЧНОСТЬ:**

класс опасности – IV/IV

**МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:**

Scorus 25 КЭ быстро распространяется в надземные части растения в результате системного действия, что приводит к нарушению биосинтеза стеринов, поддерживающих твердость клеточной мембранны. Действующее вещество подавляет процесс формирования спор и рост патогенного мицелия в тканях растения.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Препарат обладает трансламинарными свойствами, обеспечивая равномерную защиту листьев.
- Хорошо переносится сельскохозяйственными культурами, независимо от фазы развития.
- Оказывает профилактическое, лечебное и отталкивающее воздействие.
- Дождь, выпавший после 2 часов, не снижает эффективность препарата.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Является стратегическим препаратом в системе защиты плодовых деревьев.
- Хорошо переносится сельскохозяйственными культурами, независимо от фазы развития, может применяться в фазе полного цветения.
- Действие препарата не зависит от климатических условий, однако существует, оптимальный диапазон температур, при которых его действие максимально эффективно, с 14 до 25° С, при температуре ниже +12° С ответная реакция резко снижается.
- Применение в баковые смеси с контактными фунгицидами как Каптон 80 ВДГ, в соотношение 1:1 оказывает хороший эффект на длительный период.
- Небольшая норма расхода.
- Значительно уменьшает жизнеспособность спор будущего поколения.
- Совместим с большинством препаратами фитосанитарного назначения.



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Культура	Вредный объект	Норма расхода препарата, л/га	Срок ожидания перед сбором урожая (Максимальное количество обработок)	Срок выхода в поле для выполнения ручных работ (механизированных)
Яблоня	Парша яблони	0,25 - 0,3	20 (2-3)	
Слива	Монолоиз Клястероспориоз Красная пятнистость	0,25 - 0,3	14 (2-3)	
Абрикос	Клястероспориоз	0,15		7 (3)
Персик	Курчавость листьев Клястероспориоз		14 (2-3)	
Черешня	Клястероспориоз Коккомикоз	0,25		

Норма расхода рабочей жидкости: 800-1500 л/га.

### МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

- Не превышайте рекомендованные дозы.
- Не применять в ветреную погоду и при низких температурах воздуха (<12° С).
- Тщательно обрабатывайте растения.

### Профилактические обработки:

Чтобы избежать распространения инфекции в широких масштабах, желательно провести раннюю обработку в профилактических целях. Интервал между обработками зависит от климатических

условий, развития заболевания культуры и составляет 7-10 дней, при необходимости интервал может быть сокращен до нескольких дней (4-5 дней) в период обильных осадков и туманности.

### Лечебные обработки:

При первичном заражении паршой необходимо проводить лечебные обработки в наикратчайшие сроки. После первой лечебной обработки, повторить обработку с профилактической целью, после 4-5 дней, в зависимости от климатических условий.

